

**CATALOGUE DES COLLECTIONS DU MUSÉUM
CORRESPONDANT A L' « HISTOIRE NATURELLE
DES MOLLUSQUES » DE FÉRUSSAC**

(3^e partie)

Par H. CHEVALLIER

1. — **Avertissement.**

La troisième partie de notre catalogue¹ va comprendre le restant des espèces héliciformes (Helicoïdes) mentionnées dans le « Prodrôme » de FÉRUSSAC : sous-genres *Helicella* et *Helicostyla*. Ces sous-genres sont compris dans le genre *Helix* dans l'édition de DESHAYES de l'« Histoire Naturelle des Mollusques » (tome I).

Nous rappelons que l'astérisque indique les lots d'échantillons ayant conservé l'étiquette originale de FÉRUSSAC.

2. — **Catalogue (suite).**

III. — GENRE *Helix*, SOUS-GENRES *Helicella* et *Helicostyla*.

Genre **Helix** (Müller), P. p. 22 (suite).

(**Helicoïdes**).

Sous-genre **Helicella** (nob.), P. p. 37.

Helicel. Carascalensis (nob.), P. p. 38, n^o 158 — *H. Carascalensis* Fér., Hist. I, p. 105, pl. 67, fig. 1. Six types dont l'ex. figuré ?, forêt de Carascal, Aragon* et 3 ex. de Caunterets*.

H. glacialis (Thomas), P. p. 38, n^o 159 — *H. glacialis* Fér., Hist. I, p. 40, pl. 67, fig. 2. Huit types dont l'ex. figuré ?, Lanzo, Piémont* (Thomas et Charpentier ?).

H. Alpina (Faure Big.), P. p. 38, n^o 160 — *H. alpina* Fér., Hist. I, p. 36, pl. 67, fig. 3. Deux types dont l'ex. figuré ?, Die, Dauphiné* et 12 ex.,

1. Pour la 1^{re} partie, voir le *Bull. Mus.*, 37, n^o 1, 1965, pp. 162-172 et pour la 2^e partie, *ibid.*, 37, n^o 3, 1965, p. 476-489.

Gde Chartreuse*. Syn. = *H. Fontenellii* Mich. (selon Desh.), 4 ex., Gde Chartreuse* ; *H. tigrina* Jan = *H. Fontenellii* Mich. (selon Fér., Bull. Zool. II, p. 87), 4 ex. d'Italie dont 1 ex. d'auteur ; voir *H. tigrina* Jan, Hist. I, p. 37, pl. 69 J, fig. 14-17.

H. cornea (Drap.), P. p. 38, n° 161 — *H. cornea* Drap., Hist. I, p. 39, pl. 67, fig. 4, 5 et 69 J, fig. 9. Trois lots de France. Syn. var. α = *H. squammata* Serres, 5 ex., Montpellier et Saintonge* ; var. = *H. Desmoulinsii* Far. (selon Desh., voir pl. 69 J ; in Fér., Bull. Zool. II, p. 41), 3 ex., Pyrénées Orient.*

H. strigata (Müll.), P. p. 38, n° 162 — *H. strigata* Müll., Hist. I, p. 44, pl. 67, fig. 6, 7 et 75 B, fig. 5. Deux lots d'Italie*. Syn. var. α = *H. signata* Charp., 4 ex. conformes aux fig., Paestum ; var. β = *H. planorbella* Lmk. (selon Desh., Hist. I, p. 45, pl. 67, fig. 8), 3 ex., Canaries (Maugé).

H. intermedia (nob.), P. p. 38, n° 163 — *H. intermedia* Fér., Hist. I, p. 43, pl. 68, fig. 1, 2. Quatre types non figurés, Frioul vénitien* (= *H. striata* Fér. père) et 9 ex. d'Illyrie* (Stentz).

H. cingulata (Stud.), P. p. 38, n° 164 = *H. cingulata* Stud., Hist. I, p. 31, pl. 68 fig. 5, 6. Six ex. dont le type figuré, Frioul vénitien, Lugano* (= *H. subflava* Fér. père). Syn. var. α = *H. insubrica* Jan (selon Desh., Hist. I, p. 30, pl. 68, fig. 3), 2 ex., lac de Côme* ; var. = *H. cingulina* Desh. (id., p. 26, pl. 68, fig. 4), 3 types dont l'ex. figuré ?, Scheneberg, Vienne* (Partsch) ; var. = *H. cyclolabris* Desh. (id., p. 32, pl. 68, fig. 7) : voir *H. zonata* var. β Fér. ? (P. n° 165).

H. zonata (Stud.), P. p. 38, n° 165. Syn. var. α = *H. foetens* Stud., Hist. I, p. 25, pl. 68, fig. 8, 9 ; 69 A, fig. 3 (et 4 ?) et 75 B, fig. 4, un ex. du Mont Rose* (variété citée par Desh.) et 6 autres lots : Suisse ?*, Illyrie*, Monfalcon*, Alpes*, Valais* et Italie* (= *H. aspera* Jan : ex. d'auteur) ; « var. β = *H. cyclostoma* Desh. » : voir *H. cyclolabris* Desh. ? (Hist., *supr. cit.*), 4 ex., Naxie* (Olivier) et 2 ex., Morée* (Virlet) ; var. = *H. trizona* Ziegl. (selon Desh., Hist. I, p. 23, pl. 68, fig. 10 centrale et 69 A fig. 6), 3 lots : Allemagne et Banat. Lots à déterminer : 2 ex. de Jan, « *H. vittata* Jan — *H. zonata* Pfr. », Italie bor. ? ; 2 ex., « *H. fulvo rufa* » (Fér. père), Hte Autriche, Frioul vénitien* ; 1 ex., « *H. Ionica* Meg. an *H. zonata* var. », îles Ioniennes ?*. Voir également dans l'Hist. : *H. planospira* Lmk., p. 23, pl. 68, fig. 10 latérales (= *H. hispana* L., sur l'atlas) et *H. zonata* Fér., p. 27, pl. 69 A, fig. 4 (sur l'atlas).

H. Naxientia = *Naxiana* (nob.), P. p. 38, n° 166 et correct. p. 68 — *H. Naxiana* Fér., Hist. I, p. 172, pl. 69, fig. 1. Deux types dont un semblable à la fig., Naxie et Mt Palaio Castro, Candie* (Olivier) et 3 paratypoides, Naxie (Oliv. ; coll. Fér. ?)

H. lecta (nob.), P. p. 38, n° 167 — *H. lecta* Fér., Hist. I, p. 173, pl. 69, fig. 2. Deux types dont l'ex. figuré ?, Mt Palaio Castro, Candie* (Oliv.)

H. pellita (nob.), P. p. 38, n° 168 — *H. pellita* Fér., Hist. I, p. 173, pl. 69, fig. 3. Trois types dont un sembl. à la fig., Rhodes* (Oliv.)

- H. Martigena* (nob.), P. p. 38, n° 169 — *H. Martigena* Fér., Hist. I, p. 69, pl. 69, fig. 4. Types non localisés.
- H. Pyrenaica* (Drap.), P. p. 38, n° 170 — *H. pyrenaica* Drap., Hist. I, p. 41, pl. 69, fig. 5. Deux ex., Pyrénées Orient.
- H. Lefeburiana* (nob.), P. p. 38, n° 171 — *H. feburiana* Fér., Hist. I, p. 28, pl. 69, fig. 6. Trois types conformes à la fig., Monfalcon et 1 ex. non figuré, Illyrie*.
- H. Quimperiana* (nob.), P. p. 39, n° 172, pl. 76, fig. 2 — *H. Corisopitensis* Fér., Hist. I, p. 15, *ibid.* et pl. 75B, fig. 1-3. Deux types, bords de l'Odet ; 1 type, Quimper (Desmarests ; coll. Fér. ?) ; 4 types de la var. α , sans localité* et 2 autres lots : Brest (coll. Fér.) et Quimper (coll. Rang). Tous ces ex. ne sont sans doute pas les ex. figurés.
- H. pulchella* (Müll.), P. p. 39, n° 173 — *H. pulchella* Müll., Hist. I, p. 21, pl. 69 E, fig. 12-17. Deux ex. fossiles, sans loc.* Syn. = *H. paludosa* (aut. angl.), 1 lot, Yorkshire ; var. α = *H. costata* Müll. (voir fig. 15, 16), 4 ex., Suisse.
- H. Richardii* = *Richardi* (nob.), P. p. 39, n° 174 et correct. p. 68 — *H. profunda* Say, Hist. I, p. 69, pl. 70, fig. 4. Deux types non figurés, Amérique sept. (Richard ; coll. Fér. ?) et 6 types probables, sans étiquette : Caroline ?
- H. zonalis* (nob.), P. p. 39, n° 175 — *H. zonalis*, Hist. I, p. 50, pl. 70, fig. 3. L'holotype figuré ?, sans loc.*
- H. exepitiuncula* (nob.), P. p. 39, n° 176 — *H. exepitiuncula* Fér., Hist. I, p. 155, pl. 70, fig. 1 et 73 A fig. 1. Le type de la pl. 73 A, sans loc.*
- H. zonaria* (Müll.), P. p. 38, n° 177 (pl. 73) ; Voy. de l'Uranie, p. 469 — *H. zonaria* L., Hist. I, p. 52, pl. 71, fig. 6-10 et 73 fig. 3-10. Quatre lots : « Gdes Indes » et îles Bourou* (pl. 71, fig. 9-10), Timor (pl. 73, fig. 3 ; et fig. 2 ?), Seringapatan* (id. fig. 5) et sans loc.* (« var. »). Syn. var. β = *H. tortilabia* Less., au Muséum : 1 ex. de Lesson et Garnot, Bourou ; var. = *H. Coluber* Beck (selon Desh., Hist. I, p. 54, pl. 73, fig. 1, 2), l'ex. de la fig. 2 ? : voir le lot de Timor.
- H. proxima* (nob.), P. p. 39, n° 178 — *H. proxima* Fér., Hist. I, p. 29, pl. 71, fig. 5. Deux types dont un sembl. à la fig., Pondichéry (coll. Fér.)
- H. fallaciosa* (nob.), P. p. 39, n° 179 — *H. fallaciosa* Fér., Hist. I, p. 54, pl. 71, fig. 1-3. Quatre types dont ceux des fig. 1 et 3, Coïmbetore* (Leschenault) ; 5 ex. dont un sembl. à la fig. 2, Pondichéry (id. ; coll. Fér. ?) et 1 ex., Bundelkhund (Jacquemont 1833 ; coll. Fér. ?)
- H. ruginosa* (nob.), P. p. 39, n° 180 — *H. ruginosa*, Hist. I, p. 38, pl. 71, fig. 4. L'holotype figuré et le paratype jeune, Bengale (Leschenault ; Muséum)
- H. madecassina* (nob.), P. correct. p. 68, n° 180 bis — *H. madecassina* Fér., Hist. I, p. 55, pl. 73 A, fig. 2. L'holotype figuré et un paratype, Madagascar* ; ex. contrôlés par E. Fischer (*J. Conchyl.*, 1952, p. 7).

- H. laxata* (nob.), P. p. 39, n° 181 — *H. laxata* Fér., Hist. I, p. 62, pl. 74, fig. 3. Quatre ex. dont un sembl. à la fig. centrale, Chili (Dombey; coll. Fér. ?); 1 paratype de 18 mm non figuré, Pérou* (Dombey) et 1 ex. de 74 mm, Maule, Chili* (Cuming, Parreys).
- H. pernobilis* (nob.), P. p. 39; n° 182 — *H. pernobilis* Fér., Hist. I, p. 61, pl. 74, fig. 2. Néant : la fig. a été copiée sur Martyn.
- H. sepulcralis* (nob.), P. p. 39, n° 183, pl. 75, fig. 1; Cata. de Rang n° 23 *H. sepulcralis* Fér., Hist. I, p. 51, *ibid.* et pl. 75 C, fig. 1-12. Selon E. Fischer (*J. Conchyl.*, 1952, pp. 41 et suivantes), les fig. de l'Hist. correspondent aux espèces suivantes. *Ampelita sepulcralis* Fér. : pl. 75, fig. 1 (forme typique) et pl. 75 C, fig. 4, 5, 11 et 12, l'holotype de la pl. 75 et 1 paratype et 3 ex. non figurés (var. *olivacea* Pilsb.); *Ampelita hova* Ang : pl. 75 C, fig. 2, 3, 8 et 10 et sa var. *sakalava* Ang. : id. fig. 6, 7, deux ex. se rapprochant des fig. 2, 3 et 3 ex. des fig. 6, 7. Les autres ex. de la coll. Fér. (ex. non figurés) se rapportent à l'*Ampelita subsepulcralis* Crosse (1 ex.) et ses var. *obscura* Cr. et F. (1 ex.) et *negro-purpurea* Cr. et F., soit l'ex. de Ste Marie de M.* (Rang) et l'ex. étiqueté « *H. porcaria* Mab. » et figuré par E. Fischer.
- H. zodiaca* (nob.), P. p. 39, n° 184, pl. 75, fig. 2 — *H. zodiaca* Fér., Hist. I, p. 45, *ibid.* L'holotype figuré, sans loc. (Muséum).
- H. pellis serpentis* (Chemn.), P. p., 39, n° 185 et correct. p. 69; Rang, Voy. n° 4 — *H. pellis serpentis* Chemn., Hist. I, p. 62, pl. 75 A, fig. 2, 3. Un ex., Mtgne aux tiges, Cayenne* (cet ex. doit être en réalité un *H. heliaca* d'Orb.)
- H. dilata* (Perry), P. p. 39, n° 186. Néant.
- H. collapsa* (Perry), P. p. 39, n° 187. Néant.
- H. planulata* (Lmk.), P. correct. p. 69, n° 187 bis — *H. planulata* Lmk., Hist. I, p. 48, pl. 73 A, fig. 3. Deux ex. non figuré, Philippines.
- H. divaricata* (Perry), P. p. 39, n° 188. Néant.
- H. Senegalensis* (Chemn.), P. p. 39, n° 189 — *H. cicatricosa* Müll., Hist. p. 168, pl. 78, fig. 1, 2. Néant.
- H. trifasciata* (Chemn.), P. p. 39, n° 190 — *H. laevipes* Müll., Hist. I, p. 177, pl. 92, fig. 3, 4. Néant.
- H. unguicula* (nob.), P. p. 39, n° 191, pl. 76, fig. 3, 4 — *H. unguicula* Fér., Hist. I, p. 12, *ibid.*, 2 ex. sans doute non figurés, sans loc. (coll. Roussel) et 1 ex. de 27 mm, « Chine » (Eyduoux, 1832; coll. Fér. ?)
- H. ungulina* (L.), P. p. 40, n° 192 — *H. ungulina* L., Hist. I, p. 11, pl. 77, fig. 2, 3. L'ex. figuré, fig. 2 ?, sans loc.* et 1 ex. de même taille que la fig. 3, Java (Leschenault; coll. Fér. ?)
- H. circumdata* (nob.), P. p. 40, n° 193, pl. 76, fig. 1; Voy. de l'Uranie, p. 470 — *H. circumdata* Fér., Hist. I, p. 13, *ibid.* et pl. 77 fig. 1. Le type de la pl. 76 ? (« *aff.* »), Moluques*.
- H. polygyrata* (Born), P. p. 40, n° 194 — *H. polygyrata* Born, Hist. I, p. 4, pl. 96 A, fig. 7-9 et 69 B, fig. 5. Ex. non localisés.

- H. lineata* (Say), P. p. 40, n° 195 — *H. lineata* Say, Hist. I, p. 80, pl. 79, fig. 1 et 86, fig. 5. Six ex., Etats Unis* (Say, Hyde).
- H. rotundata* (Müll.), P. p. 40, n° 196 — *H. rotundata* Müll., Hist. I, p. 79, pl. 79, fig. 2-5. Un lot, loc. incertaine (= *H. perspectiva* Mcg. ?)
- H. ruderata* (Stud.), P. p. 40, n° 197 — *H. ruderata* Stud., Hist. I, p. 81, pl. 79, fig. 6. Ex. non localisés.
- H. perspectiva* (Say), P. p. 40, n° 198 — *H. perspectiva* Say, Hist. I, p. 81, pl. 79, fig. 7. Un lot, Etats Unis* (Say, Hyde).
- H. alternata* (Say), P. p. 40, n° 199 — *H. alternata* Say, Hist. I, p. 89, pl. 79, fig. 8-10. Un lot, Amérique du N., New-York, Ohio* ; var. α *carinata* : 2 ex. dont l'ex. de la fig. 10 ?, Kentucky* (Rafinesque).
- H. pygmaea* = *pygmaea* (Drap.), P. p. 40, n° 200 et correct. p. 69 — *H. pygmaea*, Hist. I, p. 98, pl. 80, fig. 1. Quatre ex., Midi de la France.
- H. rupestris* (Drap.), P. p. 40, n° 201 — *H. rupestris* Drap., Hist. I, p. 253, pl. 80, fig. 2, 3. Un lot, Bex*.
- H. verticillus* (nob.), P. p. 40, n° 202 — *H. verticillus* Fér., Hist. I, p. 92, pl. 80 fig. 8, 9. Six types dont 3 ex. jeunes (voir fig. 9), Autriche et 7 types dont 2 sembl. aux fig. 8, Vienne ?* (Partsch) ; ex. nommés par Fér. « *H. algiroides* ».
- H. algira* (L.), P. p. 40, n° 203, pl. 81 — *H. algira* L., Hist. I, p. 91, *ibid.*, 1 ex. (fig. 7 ?), Toulon et 3 ex. (fig. 4), Marseille.
- H. Gemonense* (nob.), P. p. 40, n° 204 — *H. Gemonensis* Fér., Hist. I, p. 365, pl. 80, fig. 6. L'holotype figuré et 2 paratypes, Gemona, Frioul vénitien*.
- H. olivetorum* (Gmel.) (= *H. incerta* Drap.), P. p. 40, n° 205 — *H. olivetorum* Gmel., Hist. I, p. 92, pl. 82, fig. 7-18. Quatre ex fossiles étiquetés « *H. semirufa vel incerta-olivetorum* », Villefranche d'Aveyron* (Serres).
- H. capillacea* (nob.), P. p. 40, n° 206 — *H. capillacea* Fér., Hist. I, p. 95, pl. 82, fig. 5. Trois types dont 2 sembl. à la fig., Port Jackson* ; var. α ? : 2 types, île Maurice (Mathieu ; coll. Fér. ?)
- H. protensa* (nob.), P. p. 40, n° 207 — *H. protensa* Fér., Hist. I, p. 93, pl. 82, fig. 3. L'holotype figuré ?, Standie (Oliv.) et 3 ex. désignés par L. Forcart (en 1959) comme lectotype et paratypoïdes, sans loc. (coll. Fér. ?)
- H. concolor* (nob.), P. p. 40, n° 208 — *H. concolor* Fér., Hist. I, p. 98, pl. 82, fig. 2. Quatre ex. dont l'holotype figuré ?, Guadeloupe* (Lardenoi) et 7 types, Ténériffe* (Maugé).
- H. convexa* (nob.), P. p. 40, n° 209 — *H. Frivaldskyana* Rossm., Hist. I, p. 97, pl. 82, fig. 1. Type absent. Syn. = *H. diaphana* Kryn. ? (Bull. Zool. II, p. 21), 4 ex. d'auteur, Crimée*.
- H. glaphyra* (Say), P. p. 41, n° 210 — *H. cellaria* Müll., Hist. I, p. 96. Néant.
- H. planorboides* (Raf.), P. p. 41, n° 211 — *H. planorboides* Raf., Hist. I, p. 87, pl. 82, fig. 4. Trois types non figurés, Kentucky* (Raf.)

- H. cellaria* (Müll.), P. p. 41, n° 212 — *H. cellaria* Müll., Hist. I, p. 96, pl. 84, fig. 9, 10. Six lots : Pyrénées, Heidelberg*, Pise*, Naples, Malte*, Ténériffe* (Webb). Syn. = *H. nitida* Drap., 3 ex., Constantinople*.
- H. nitidula* (Drap.), P. p. 41, n° 213. Trois lots : Heidelberg*, Scarborough, Valais*. Syn. var. = *H. nitidula* Ald., 2 ex., Scarborough ; = *H. Helmi* « Bean » ?, 5 ex., id.* ; = *H. cellaria* Stud., 4 ex. d'auteur, Suisse* ; = *H. hiulca* Jan, 2 ex. d'auteur, Italie boréale* enfin 1 ex. étiqueté « *H. nitidula* Pfr. », id. (Jan).
- H. nitidosa* (nob.), P. p. 41, n° 214. Deux types, Suisse ?* (Charpentier) : « = *H. nitidula* var. α Drap. » et 2 ex., Angleterre. Syn. var. = *H. pura* Ald. et *H. Alderi* Bean, 4 ex., sans loc.* (Bean et Kenyon).
- H. glabra* (Stud.), P. p. 41, n° 215. Deux ex., Suisse.*
- H. nitens* (Mat. et Rack.), P. p. 41, n° 216 — *H. cellaria* Müll., Hist., *supra*. Quatre ex., Eton*. Syn. = *H. lucida* Montg., 4 ex., sans loc.* (Bean et Leach) ; = *H. cellaria* Ald., 5 ex. d'auteur, Newcastle* et 3 ex., Scarborough* (Bean) ; = *H. cellaria* Müll. (étiquette), 3 ex., Angleterre*.
- H. vitrina* (nob.), P. p. 41, n° 217. Types non localisés.
- H. nitida* (Müll. et Stud.), P. p. 41, n° 218. Trois lots : Suisse*, Suède*, sans loc.* Syn. = *H. lucida* Drap., 3 lots : Scarborough* et Heidelberg*.
- H. arborea* (Say), P. p. 41, n° 219. Deux lots, Etats Unis* (Say, Hyde) et 1 lot, « *H. arborea* var. ? », Guadeloupe*.
- H. inaspecta* (nob.), P. p. 41, n° 220. Types non localisés.
- H. laevigata* (Raf.), P. P. 41, n° 221 — *H. laevigata* Raf., Hist. I, p. 94, pl. 82, fig. 6. Dix types dont 3 sembl. à la fig., Kentucky* (Raf.)
- H. splendens* (Faure Big.), P. p. 41, n° 222. Ex. non localisés.
- H. cristallina* (Müll.), P. p. 41, n° 223. Deux lots : Scarborough* et Autriche*.
- H. hyalina* (nob.), P. p. 41, n° 224. Types non localisés.
- H. cristula* (nob.), P. p. 41, n° 225 ; Voy. de l'Uranie, p. 471. Types non localisés.
- H. comatula* (nob.), P. p. 41, n° 226. Quatre types, Afrique (Delalande et Michaud ; coll. Fér. ?)
- H. tortula* (nob.), P. p. 41, n° 227. Trois types, sans loc. (Baudin ; coll. Fér. ?) ; voir Pfeiffer, Symb. II, p. 105.
- H. candida* (Gmel.) ? (= *H. hyalina* Gmel.), P. p. 41, n° 228. Quatre ex. étiquetés « *H. candidum* Spix », Bahia* ; voir *H. Spixiana* Pfr., Hist. I, p. 177, pl. 102, fig. 10-12.
- H. laevipes* (Müll.), P. p. 41, n° 229, pl. 92, fig. 3-6 — *H. laevipes* Müll., Hist., *ibid.* (atlas). 2 ex., non figurés, « Gdes Indes »*.
- H. leucas* (L.), P. p. 42, n° 230. Un ex., Barbarie* (Fr. Christ. de Dan.)
- H. cicatricosa* (Müll.), P. p. 42, n° 231 — *H. cicatricosa* Müll., Hist. I, p. 168, pl. 78, fig. 1, 2. Trois ex., Chine (Gaudichaud ; coll. Fér. ?)

- H. nemorensis* (Müll.), P. p. 42, n° 232. Six ex., Java.
- H. Janus bifrons* (Chemn.), P. p. 42, n° 233. Ex. non localisés.
- H. Javacensis* (nob.), P. p. 42, n° 234, pl. 92, fig. 2 — *H. Javanica* Lmk., Hist. I, p. 187, *ibid.* Deux ex. sembl. aux fig., Java (coll. Fér. ?) : types ?
- H. commendabilis* (nob.), P. p. 42, n° 235. Types non localisés. Syn. = *H. Dufourii* Grat. (selon Pfeiffer) = *Nanina Juliana* Gray (selon Tryon), 1 ex. d'*H. Juliana*, Ceylan* (Reeve).
- H. exilis* (non Müll., selon Desh.), P. p. 42, n° 236, pl. 92, fig. 1 — *H. bistrialis* Beck, Hist. I, p. 186, *ibid.* 6 ex. dont l'ex. figuré ?, Pondichéry* (pars).
- H. korékouké* (nob.), P. p. 42, n° 237 — *H. Korekouke* Fér., Hist. I, p. 180, pl. 102, fig. 7-9. Deux types non figurés, Pondichéry (Leschenault ; coll. Fér. ?)
- H. buphthalmus* (nob.), P. p. 42, n° 238 ; Bull. Zool. II, p. 33 = *H. stolephora* Val., Hist. I, p. 159, pl. 100, fig. 3-5. Deux ex. non figurés, loc. incertaine (Richard ; Humboldt) ; ces ex. ne sont pas des *H. stolephora* : l'un a été ensuite nommé « *H. rapa* Müll », l'autre, marqué « var. », est peut-être un *H. monozonalis* Lmk. Au Muséum : l'holotype figuré (in Humboldt et Bonpland) et 1 paratype de l'*H. stolephora* Val.
- H. unizonalis* (Lmk.), P. p. 42, n° 239, pl. 91, fig. 4 — *H. monozonalis* Lmk., Hist. I, p. 182, *ibid.* Voir l'ex. nommé « *H. buphthalmus* var. » ?
- H. citrina* (L.), P. p. 42, n° 240 ; Voy. de l'Uranie, p. 471 — *H. citrina* L., Hist. I, p. 189, pl. 88, fig. 1-3. Huit lots (22 ex. non figurés) : Java*, Bourou, Amboine et Waigiou (Lesson) et « Gdes Indes ».
- H. rapa* (Müll.), P. p. 42, n° 241 ; voir Hist. I, p. 188. Voir l'ex. nommé en premier lieu « *H. buphthalmus* » ? (P. n° 238).
- H. vermiculosa* (nob.), P. p. 42, n° 242 ; voir Pfeiffer, Symb. II, p. 108. Deux ex., Célèbes ? (coll. Rang).
- H. Clairvillia* (nob.), P. p. 42, n° 243, pl. 91, fig. 1-3 — *H. Clairvillia* Fér., Hist. I, p. 182, *ibid.* Néant ; le type est peut-être dans la coll. Lamarck de Genève (voir Mermod, *Rev. suis.*, t. 57, 1950, pp. 734, 735).
- H. sectilis* (nob.), P. p. 42, n° 244 ; voir Pfeiffer, Symb. II, p. 100. Types non localisés.
- H. Biguetiana* (nob.), P. p. 42, n° 245. Un type, sans loc.*
- H. Brongnardi* (nob.), P. p. 42, n° 246. Un type, sans loc.*
- H. fulva* (Müll.), P. p. 42, n° 247. Un ex. (var. α *major*), env. de Paris.*
- H. cinctella* (Drap.), P. p. 42, n° 248. Trois ex., Nice.
- H. acutula* (nob.), P. p. 42, n° 249. Trois ex., sans loc. (Baudin ; coll. Fér. ?)
- H. aculeata* (Müll.), P. p. 42, n° 250. Un lot, Suisse et France*. Syn. = *H. spinulosa* Montg., 5 ex., Yorkshire* (Bean).
- H. ciliata* (Venetz), P. p. 43, n° 251. Quatre ex., Suisse.
- H. fasciola* (Drap.), P. p. 43, n° 252 — *H. fasciola* Drap., Hist. I, p. 109, pl. 69, fig. 1. Néant. Syn. = *H. striatula* Müll. (Fér., Essai, pp. 120-121).

- H. limbata* (Drap.), P. p. 43, n° 253 — *H. limbata* Drap., Hist. I, p. 200, pl. 55, fig. 14-18. Dix ex. dont la var. « *carina alba* » (voir fig. 18), Caen*, Quercy* et Guadeloupe.
- H. incarnata* (Müll.), P. p. 43, n° 254 — *H. incarnata* Müll., Hist. I, p. 199, pl. 55, fig. 20-22. Deux lots du Valais. Syn. = *H. lurida* Ziegl. ?, 3 ex., Illyrie* ; = *H. orrata* Jan ?, 6 ex. d'auteur, Dalmatie*.
- H. Olivieri* (nob.), P. p. 43, n° 255 ; voir Germain, Moll. de Syrie, p. 191, pl. VIII, fig. 14-16. Le type figuré par Germain, Syrie ; var. α : 3 lots-types de Zante* et 1 ex. de Naples* ; var. β : 2 types, Constantinople* (Oliv.) et 2 lots de Baruth (id.) ; var. γ : 2 types, Seyde* et 6 ex. (var. γ ?), Zante. Syn. var. γ = *H. carthusiana* Müll. (selon Desh., Hist. I, p. 202).
- H. obtrusa* = *obstructa* (nob.), P. p. 43, n° 256 et correct. p. 69 — *H. obstructa* Fér., Hist. I, p. 110, pl. 90, fig. 10. Trois types, Kermancha, Perse* (Oliv.) et 3 lots-types, Alep et Tripoli de S. (id.)
- H. carthusianella* (Drap.), P. p. 43, n° 257 = *H. carthusiana* Müll., Hist. I, p. 201, pl. 90, fig. 11. Quatre lots : France*, Crimée*, Dardanelles*. Syn. = *H. claustralis* Ziegl. (selon Desh.), 4 ex., Corfou* (Parreys).
- H. carthusiana* (Drap.), P. p. 43, n° 258 et correct. p. 69. Trois lots : Provence*, Montpellier*, Illyrie*. Syn. var. α = *H. cantiana* Montg. = *H. pallida* Donov., 4 lots : Angleterre et Yorkshire*, Florence*, sans loc.
- H. fructicum* (Müll.), P. p. 43, n° 259. Cinq lots : Dax, Arbois, Monfalcon*, Charkow*.
- H. Berytensis* (nob.), P. p. 43, n° 260 ; voir Germain, Moll. de Syrie, p. 213, pl. IX, fig. 12-14. Le type figuré par Germain, Syrie et 4 types, Baruth* (Oliv.)
- H. ambiguosa* (nob.), P. p. 43, n° 261. Espèce barrée : les étiquettes renvoient à l'*H. lucana* Müll. (P. n° 32) ; 2 ex. conformes aux fig. 3-5 de la pl. 10 B, sans loc*. (Lamarre-Picot).
- H. similis* (nob.), P. p. 43, n° 262 ; Cata. de Rang n° 11 ; Rang, Voy. n° 6 — *H. similis* Fér., Hist. I, p. 171, pl. 25 B, fig. 1-4 et 27 A, fig. 1-3. Cinq lots-types : Timor* (Baudin), « Nlle Hollande, Timor ? »*, Réunion* (Rang), Buitenzorg* (« *H. rubella* » par van Haan) et 2 autres lots : Rio de J. (Gaudichaud ; coll. Fér. ?) et sans loc.* (Sowerby) ; mélange probable entre les var. et avec l'*H. addita* (voir P. n° 38 bis).
- H. sutilosa* (nob.), P. p. 43, n° 263 — *H. sutilosa* Fér., Hist. I, p. 203, pl. 17 A, fig. 18, 19. Sept types dont l'ex. figuré ?, îles St Pierre et St François (Péron et Lesueur ; Muséum) et 4 ex. sans détermination certaine, id. (coll. Fér.). Syn. = *H. Jerviciensis* Q. et G., 1 type de Quoy et G., baie de Jervis (Mus.)
- H. cantiana* (Montg.), P. p. 43, n° 264 et correct. p. 69. Voir *H. carthusiana* Drap. var. α (P. n° 258).
- H. strigella* (Drap.), P. p. 43, n° 265. Ex. non localisés.
- H. villosa* (Drap.), P. p. 43, n° 266. Trois lots : Suisse ?* (var. β), Gde Chartreuse, Genève.
- H. glabella* (Drap.), P. p. 43, n° 267. Un lot, sans loc.

- H. circinata* (Stud.), P. p. 43, n° 268. Ex. non localisés. Syn. = *H. montana* Stud. (non *H. sylvatica* Drap. var. *montana* Stud.), 2 ex. (fossiles ?), sans loc.*
- H. plebeium* (Drap.), P. p. 44, n° 269. Ex. non localisés.
- H. rufescens* (Montg.), P. p. 44, n° 270. Deux lots : Angleterre* et sans loc.*
- H. hispida* (Müll.), P. p. 44, n° 271. Ex. non localisés.
- H. sericea* (« Müll., Drap. »), P. p. 44, n° 272 ; voir *H. incarnata* Müll., Hist. I, p. 199. Trois lots : Bex* (*H. sericea* Müll. ?) et Charkow* (*H. sericea* Drap. ?)
- H. revelata* (nob.), P. p. 44, n° 273. Types non localisés.
- H. caelata* (Stud.), P. p. 44, n° 274. Un ex., Suisse ?*
- H. albula* (Stud.), P. p. 44, n° 275. Ex. non localisés.
- H. Groyana* (nob.), P. p. 44, n° 276. Trois types, Sinigalia-Ancône* et 4 ex., Italie. Cette espèce ne se rapporte pas à l'*H. undata* Lowe comme l'affirme Deshayes (Hist. I, p. 165).
- H. conspurcata* (Drap.), P. p. 44, n° 277 — *H. conspurcata* Drap., Hist. I, p. 106, pl. 69 K, fig. 13-17. Deux lots, Florence.
- H. striata* (Drap.), P. p. 44, n° 278 — *H. striata* Drap., Hist. I, p. 103, pl. 85, fig. 9-13. Six lots : Naples*, Zante*, Malte*, Maroc*, Alep*. Syn. = *H. cisalpina* Jan ?, 7 ex. dont 4 ex. d'auteur, Italie ; = *H. derelicta* Jan ?, 2 lots, Sicile* (Jan ; Cristophori) ; = *H. nivea* Ziegl. ?, 2 ex., Istrie* (Stentz) ; = *H. intersecta* Poir., 7 ex., sans loc.* ; = *H. lunulata* Kryn. ? (Bull. Zool. II, p. 21), 2 ex. d'auteur, Odessa* ; = *H. ericetorum* Nilsson, 4 ex., Suède* (Pfeiffer).
- H. candidula* (Stud.), P. p. 44, n° 279. Deux lots : Sion, Suisse ?* (Venetz). Syn. = *H. thymorum* Alt., 2 lots : Allemagne ?* et Odessa*.
- H. gratiosa* (Stud.), P. p. 44, n° 280. Ex. non localisés.
- H. ericetorum* (Müll.), P. p. 44, n° 281 — *H. ericetorum* Müll., Hist. I, p. 101, pl. 85 fig. 1-4. Deux lots : Oran et Egypte*, Dublin et un individu monstr., sans loc.
- H. neglecta* (Drap.), P. p. 44, n° 282. Ex. non localisés.
- H. cespitum* (Drap.), P. p. 44, n° 283 — *H. cespitum* Drap., Hist. I, p. 100, pl. 85, fig. 5-8. Douze lots : Valence*, Alicante*, Urbin*, Alger, Oran, Skyros ?*, Géorgie, Tiflis*, Asie Mineure ?*
- H. variabilis* (Drap.), P. p. 44, n° 284. Seize lots : Angleterre, Nice*, Rome et Naples*, Ravenne, Valence*, Estrémadure*, Oran, Morée et Scio*, Illyrie*, Dardanelles*, Constantinople*, Etats-Unis*. Syn. = *H. virgata* Montg., 4 lots : Angleterre*, Yorkshire*, Dublin* ; = *H. Istriensis* Ziegl. ?, 3 ex., Istrie* (Stentz).
- H. scabra* (Chemn.), P. p. 44, n° 285. Un ex., Antilles* (Fr. Christ. de Dan.). Syn. = *H. corrugata* Gmel.
- H. variegata* (Chemn.), P. p. 45, n° 286. Néant.
- H. subrostrata* (nob.), P. p. 45, n° 287. Quatorze types dont la var. α Almeria*.

- H. Cretica* (nob.), P. p. 45, n° 288 ; voir Germain, Moll. d'Asie Min., p. 244, pl. VI, fig. 88-97. Les 5 types figurés par Germain, Rhodes* (les fig. de Germain sont des agrandissements au double) et 3 autres lots-types : Rhodes, Naxie, Standie* (Oliv.), Philoti et 1 lot de Morée* (Virlet).
- H. simulata* (nob.), P. p. 45, n° 289 ; voir Germain, Moll. de Syrie, pp. 222, 223, pl. V, fig. 17 et XII, fig. 7-9. Sept lots-types d'Alexandrie (Oliv.) dont les types de l'*H. pseudosimulata* Germ. (l'holotype figuré et 1 paratype) et 5 lots-types de Naples* (Savigny). Syn. = *H. obsoleta* Mke., 2 ex., sans loc*.
- II. Pisana* (Müll.), P. p. 45, n° 290. Dix sept lots : Cornouailles, Grasse, Montpellier et la Calle, Valence, Lisbonne*, Almeria*, Monfalcon*, la Canée* (var. *minor*), Seyde* (var. *alba*), Zante, Malte*, Alexandrie*, Egypte, Beyrouth, Etats Unis. Syn. = *II. rhodostoma* Drap., 3 lots : Almeria, Lisbonne, Zante ; = *II. melanogramma* Jan, 2 ex., Sicile ; = *H. cingenda* Montg., 7 ex., Dublin ; *II. Sardoia* Ziegl. ?, 2 ex., Sardaigne ? ; * = *H. Alboranensis* W. et B. ?, 7 ex., île Alboran (Webb) : ex. nommés par Fér. « *H. Pisana* var. » [= types de Mabilie ?]
- II. strigilata* (nob.), P. p. 45, n° 291. Six types, sans loc.* (Sowerby).
- H. lineolata* (nob.), P. p. 45, n° 292. Quatre types, Amérique* (Lacroix).
- H. carnicolor* (nob.), P. p. 45, n° 293 — *H. carnicolor* Fér., Hist. I, p. 205, pl. 29 A, fig. 14-17 (agrandissements). Les types des fig. 15, 16, sans loc.* (= *H. varians* Mke.) et 9 autres types dont l'ex. de la fig. 14, loc. incertaine*.
- H. trochus* (Müll.), P. correct. p. 69, n° 293 *bis*. Néant.
- H. subdentata* (nob.), P. p. 45, n° 294, pl. 27, fig. 1, 2 — *H. subdentata* Fér., Hist. I, p. 245, *ibid.* L'holotype figuré et 1 paratype, Mogador et une étiquette sans ex., « Canaries, Perse ? ». Selon Mabilie (Can. VII, p. 206), c'est une espèce de Mogador.
- H. planata* (Chemn.), P. p. 45, n° 295, pl. 30, fig. 2 — *H. planata* Chemn., Hist., I, p. 346, *ibid.* Six ex. non figurés, Maroc.
- II. albella* (Drap.), P. p. 45, n° 296. Deux lots : Oran, Valence*.
- H. exclusa* (nob.), P. p. 45, n° 297 ; Voy. de l'Uranie, p. 472. Types non localisés ; au Muséum : 1 ex. de Quoy et G., Vanikoro (expéd. d'Urville). Syn. = *H. planorbis* Less., au Mus. : 4 ex. (types ?) de Lesson et Garnot, Nlle Guinée.
- H. pyramidata* (Drap.), P. p. 45, n° 298. Deux lots : Alger* et Dalmatie* (= *H. fabulosa* Ziegl.)
- H. maritima* (Drap.), P. p. 45, n° 299. Deux lots douteux : Zante*, Sicile* et 2 lots nommés (non par Fér.) *H. lineata* Oliv. : Angleterre, Cornouailles.
- H. crenulata* (Oliv.), P. p. 45, n° 300. Neuf types, Alexandrie (Oliv. ; coll. Fér. ?) et 3 ex. (types ?), id., colonne de Pompée*.
- H. trochiformis* (nob.), P. p. 45, n° 301. Un type, Tahiti* (Cuming, Parreys).
- H. Ilfordia* (nob.), P. p. 45, n° 302. Un type, sans loc.* (Leach).

- H. elegans* (Gmel.), P. p. 45, n° 303. Sept ex. de la var. *α depressa*, Civitta Vecchia*.
- H. elata* (Faure Big.), P. p. 46, n° 304. Six types, Capri* (F. B.) et Sicile* (Leach). Syn. (non de Fér.) « *H. elata* Fér. = *H. Caronis* Desh. » — voir *H. Caroni* Desh., Hist. I, p. 336, pl. 69 B, fig. 8, 9 — un type de 12 mm, Palerme (Caron 1836 ; Mus.) et 2 lots de Sicile (Mus. et coll. Fér.)
- H. conica* (Drap.), P. p. 46, n° 305. Trois lots : Archipel*, Malte*, Dalmatie*, Syn. var. *minor* = *H. turritella* Ziegl., 1 lot, Dalmatie ou Galicie ; = *H. pyramidella* Jan ? , 2 ex., Vicenza (Cristophori et Jan ?)

Sous-genre **Helicostyla** (nob.), P. p. 46 et correct. p. 69.

- FÉRUSSE par des notes manuscrites a réparti les espèces de ce sous-genre dans les sous-genres suivants : *Helicella* (pour les espèces n° 306, 307, 308), *Helicodonta* (n° 309 à 315), *Helicogena* (n° 316 à 320) et *Helicigona* ? (n° 321).
- Helicost. misella* (nob.), P. p. 46, n° 306 ; Voy. de l'Uranie, p. 473. Huit types, Guam (Quoy et G. ; coll. Fér. ?)
- H. dolosa* (nob.), P. p. 46, n° 307. Huit types, le Cap* (Delalande).
- H. ochroleuca* (nob.), P. p. 46, n° 308, pl. 30, fig. 1 — *H. ochroleuca* Fér., Hist. I, p. 183, *ibid.* L'holotype figuré et 3 paratypes, sans loc.*
- H. epistylum* (Müll.), P. p. 46, n° 309 et correct. p. 68, pl. 51 B (« 101 ») fig. 4 — *H. epistylum* Müll., Hist. I, p. 326, pl. 50 A, fig. 4, 5. Quatre ex. dont un sembl. aux fig. de la pl. 51 B, Jamaïque ; selon Desh. (Hist. I, p. 326), ces fig. se rapportent à l'*H. Cookiana* Gmel.
- H. epistylioides* (nob.), P. p. 46, n° 310 et correct. p. 68, pl. 51 B (« 101 »), fig. 2 — *H. epistylioides* Fér., Hist. I, p. 325, *ibid.* Types non localisés ; au Muséum : 2 ex. conformes aux fig. de Fér., Jamaïque (Cuming, 1846).
- H. Rafinesquia* = *Rafinesquea* (nob.), P. p. 46, n° 311 et correct. p. 68 — *H. ligera* Say, Hist. I, p. 184, pl. 51 A, fig. 5. Deux types probables, Kentucky ; 5 ex. d'*H. ligera*, Missouri et 4 ex. étiquetés « *H. ligera* Say an *gularis* Say ? » : voir *H. gularis* Say, Hist. I, p. 208, pl. 51 A, fig. 4.
- H. delicatula* (nob.), P. p. 46, n° 312. Un type, « Gdes Indes »*.
- H. connexiva* (nob.), P. p. 46, n° 313. Deux types, Afrique (Delalande ; coll. Fér. ?)
- H. depressa* (nob.), P. p. 46, n° 314. Types non localisés ; au Muséum : 2 ex. de l'île Maurice (Rousseau, 1841).
- H. unidentata* (Chemn.), P. p. 47, n° 315 et correct. p. 69 — *H. unidentata* Chemn., Hist. I, p. 214, pl. 104, fig. 8, 9 et 105, fig. 4. Trois lots des Seychelles (Dufo ; Mus.) : ex. non figurés.
- H. Studeriana* (nob.), P. p. 47, n° 316, pl. 103, fig. 6 — *H. Studeriana* Fér., Hist. I, p. 215, *ibid.* Types non localisés ; au Muséum : 5 ex. des Seychelles (Dufo) dont 2 « très jeunes individus retirés de l'oviducte du mollusque qui est ovovivipare ».
- H. strobilus* (nob.), P. p. 47, n° 317, pl. 103, fig. 1 — *H. strobilus* Fér., Hist. I, p. 213, *ibid.* 3 types non figurés, Antilles.

- H. avellanea* (nob.), P. p. 47, n° 318, pl. 103, fig. 4, 5 — *H. avellanea* Fér., Hist. I, p. 212, *ibid.* L'holotype figuré ?, sans loc.*.
- H. alauda* (nob.), P. p. 47, n° 319, pl. 103, fig. 2, 3 — *H. alauda* Fér., Hist. I, p. 212, *ibid.* et pl. 104, fig. 4, 5. Huit ex. non figurés : 2 types, sans loc.* ; 2 types (« var. »), Santiago de Cuba* (Rang) et 4 ex., id. (coll. Rang).
- H. diaphana* (Lmk.), P. correct. p. 69, n° 319 *bis* — *H. diaphana* Lmk., Hist. I, p. 222, pl. 104, fig. 1. Néant.
- H. Roissiana* (nob.), P. correct. p. 69, n° 319 *ter* — *H. Roissyana* Fér., Hist. I, p. 297, pl. 104, fig. 2, 3 et 107, fig. 11-13. Le type de la pl. 104, Manille.*
- H. mirabilis* (nob.), P. p. 47, n° 320 et correct. p. 69, pl. 31, fig. 4-6 — *H. mirabilis* Fér., Hist. I, p. 319, *ibid.* et pl. 105, fig. 3 ? ; 107 A, fig. 1, 2 ; 108 A, fig. 17, 18 ; 108 B, fig. 9, 10 ; 108 C, fig. 3-6 et 110 B, fig. 2. Deux types dont l'holotype de la pl. 31 ?, Manille ; l'ex. de la pl. 105, étiqueté « *Helic. fuscofasciata nob.* [Lmk. ?] — *mirabilis monstr. Fér.* » et 3 ex. de la coll. Rang, soit 1 ex. nommé « var. *bifasciata* » (= *H. ignobilis* Sow. ?, Hist. I, p. 312, pl. 107 A, fig. 5, 6) et 2 ex. « var. *unifasciata* » (= *H. metaformis* Fér. ?, P. n° 322), Manille et Philippines.
- H. coniformis* (nob.), P. p. 47, n° 321, pl. 108, fig. 1 — *H. coniformis* Fér., Hist. I, p. 322, *ibid.* Types non localisés. Syn. = *H. Tuffetii* Less., au Muséum : 3 types de Lesson et Garnot, Nlle Irlande (expéd. Duperrey).

(à suivre)